

Igényeim	
Fény	Félárnyékos helyet kedvelek, ám az árnyékot is jól viselem. Tűző napon igénylem a fokozott öntözést!
Víz	Mezofita, azaz közepes vízigényű vagyok! Nyáron, kánikula idején feltétlenül öntözzél!
Hőmérséklet	A magyarországi klimatikus viszonyokat jól bírom, örökzöld dísznövény vagyok.
Talaj	Jó minőségű, tápanyagban gazdag talajt igénylek, ám a szélsőséges talajviszonyok kivételével bármilyen talajon jól fejlődök.
Egyéb	Ahol jól érzem magam, ott sűrű, tömött felületet képezek és a gyomok nem tudnak átnőni. Hosszan, májusban, júniusban virágzom. Őszi termésdíszemet is hosszan megőrzöm.

Felhasználásom	
Talajtakaró	Talajtakaróként magasabb növésűnek számítok. Terülő, legyökeresedő hajtásaim révén alkalmas vagyok a feladatra.
Gyep pótló	Mivel a félárnyékot kedvelem, az árnyékos helyeket elviselem, ezért erre a célra is használható vagyok.
Támfalakra	Lecsüngő hajtásaim támfalak rideg felületét szépen oldja, takarja.

Betegségeim, kártevőim



Levél- és gyökérelhalás (Phytophthora sp.)

A leveleken élesen elhatárolódó barna foltok, a gyökere barnul, a növekedésem leáll, és nagy eséllyel rövid időn belül elszáradok.

⇒Védekezés

Távolíts el, esetleg **fungicides beöntözés** alkalmazása.

Zöld almalevélte- tű (Aphis pomi)

Szívogatása gyengít, és torzulásokat okoz a növekedésben, a képződő mézharmaton korompenész telepedik meg, ami esztétikai és asszimilációs zavarokat okoz.

	⇒Vegyszeres védekezés Megjelenésük esetén levéltetű elleni szerekkel szükséges permetezni ilyen szerek lehetnek a Decis 2,5 EC a Sherpa 100 EC, a Pirimor 50 WG és hasonló permetezőszerek.
Gyapjas lepke (Lymantria dispar)	Gyakori és jelentős kártevő, tömeges megjelenése esetén hernyója képes tarrá rágni. Ez a pusztítás ugyan nem vezet a teljes pusztulásomhoz, de a fejlődésben nagy mértékben visszavet. A lárvák gyakorlatilag bármilyen fás szárú növény lombját elfogyasztja. Áprilisban kelnek és június-július hónapokban bábozódnak. ⇒Vegyszeres védekezés Kitinképződést gátló szerek és BT készítmények (ilyen a Dipel és a Novodor) használhatók, lehetőleg az inváziót látva azonnal!
Vértetű (Eriosoma lanigerum)	A hajtásaimat, ágaimat, sőt még a gyökeremet is szívogatja. A gyökérnyakon telelő szárnyatlan nőtény már februárban elindulhat a vesszők felé, évente több nemzedékük lehet, testük eleinte csupasz, később viaszos váladékkal védik telepeiket. Nyáluk hatására rákos duzzanatok keletkeznek a megtámadott vesszőimen. ⇒Védekezés Nagyban segít a megfelelő tápanyag-ellátásom biztosítása, mert a egészségesebb és ellenállóbb leszek ezáltal. ⇒Vegyszeres védekezés Őszi és tavaszi lemosó-permetezés javasolt szere az Nevikén, később, a rajzás észlelésekor pedig a Pirimor 50 WG vagy a Karate 2,5 WG permetezőszerek valamelyike használható. Mindezen betegségek és kártevők megelőzésüként, általános védekezéshez, segítségül ajánlott ősszel, lombhullás után és kora tavasszal, lombfakadás előtt olajos lemosó-permetezést alkalmazni, ehhez a Mészkénlé, a Nevikén és a Novenda permetezőszerek valamelyike használható.