

Igényeim	
Fény	Félárnyékos, árnyékos helyeket kedvelek, tűző napra, csak fokozott öntözés biztosításával ültethetsz.
Víz	Páraigényes és vízigényes vagyok. Normál, gondozott díszkertben, díszparkban jól érzem magam.
Hőmérséklet	A magyarországi teleket jól bírom, nyári kánikulában is helytállok, megfelelő öntözés biztosítása mellett.
Talaj	Jó minőségű, tápanyagban gazdag, jó vízáteresztő képességű, kissé kötött, humuszban gazdag talajt előnyben részesítem! Meszes talajt nem kedvelem!
Egyéb	Virágaim változatos formájúak, változatos méretűek és a színskála sok színében pompáznak. Tavasszal vágj vissza a fejlett rügyeimig, így bokrosodom és nagyobb virágtömeget produkálok.

Felhasználásom

Szoliter

Egyedi díszként virágpompám miatt nyugodtan használhatsz.

Csoport

Nagyobb kertekben vagy parkokban telepíthetsz kisebb csoportokban, ha célod a nagy tömegű, egész nyáron át virágzó csoport létrehozása. Ügyelj arra, hogy a csoportok színben elkülönüljenek, különben az összhatás egy nagy kavalkád lesz!

Balkon

Méretem elfogadható balkonon, balkonládában tartani, ahol virágpompám szintén kiváló dísz képez.

Betegségeim, kártevőim

Az előzőekben részletezett igényeim biztosítása esetén, normál díszkerti viszonyok között betegségek, kártevők nem támadnak.

Nem megfelelő körülmények között tartva megjelenhetnek rajtam kártevők és betegségek is:

Takácsatka (*Tetranychus urticae*)



Levelem fonákán szívogat. A károsított leveleim kezdetben az erek mentén, a szívogatás hatására sárgulnak, majd megbarnulnak, és idő-előtt lehullnak. Aztán a takácsatkára jellemző pókhálószerű szövedék lesz látható.

⇒Vegyszeres védekezés:

Az atkákat észlelve ajánlatos azonnal elkezdni védekezni, használható a Fulmite 200, a Sanmite 20 WP speciális atkaölő szerek valamelyike. Ezek hosszú hatástartamú (40-60 nap) atkaölő szerek, ezért jól időzítve lehet, hogy elég egy évben egyszer (április-május) elvégezni a permetezést. Szükség esetén a következő kezeléshez váltott szert használj!

Hortenzia lisztharmat (*Oidium hortensiae*)



Levelem színén a lisztharmatra nem jellemző, kör alakú, sárgás-fehér folt jelenik meg, amit csak hosszabb idő elteltével követ a levél fonákomon jelentkező, jellegzetes lisztharmat, amely esetenként az egész levélfelületemet is beboríthatja.

Erős fertőzés esetén, már augusztusban elveszthetem lombozatomat.

⇒**Védekezés**

Megjelenése kezdetén védekezhetsz a fertőzött levelek eltávolításával, elégetésével.

⇒**Vegyszeres védekezés**

Erős fertőzés esetén, kéthetente lisztharmat elleni gombaölő szerrel szükséges permetezned, különösen ajánlott ez ott, ahol nagyobb állományomat tartasz fenn.

Fontos ősze, és kora tavasszal lemosó-permetezésben részesítened, ehhez a **Mészkénlé**, a **Nevikén** és a **Novenda** lemosó-permetezőszerek valamelyike használható.