

Igényeim	
Fény	Napos, erős szélről védett helyekre javasolt az ültetés, öntözés biztosításával.
Víz	Páraigényes és vízigényes vagyok. Normál, gondozott díszkertben, díszparkban jól érzem magam.
Hőmérséklet	A magyarországi teleket kiválóan bírom, nyári kánikulában is helytálok, megfelelő öntözés biztosítása mellett.
Talaj	Jó minőségű, tápanyagban gazdag, jó vízáteresztő képességű, kissé kötött, humuszban gazdag talajt előnyben részesítem! Meszes talajt nem kedvelem!
Egyéb	Virágzatom hosszú, nagy, tömött, szélesen kúpos virágzatok, melyek nyár közepétől, végétől virágoznak, van fajtám, amely még novemberben is tartja virágzatát. Kora tavasszal vágj vissza 1-2 fejlett rügyeimig, így bokrosodom és nagyobb virágtömeget produkálok.

Felhasználásom

Szoliter

Csak ez az ültetési mód javasolt számomra, mivel más cserjék közelségét nem kedvelem!

Gyönyörű virágzatom és hosszan tartó virágzásom, látványos megjelenést kölcsönöz számomra. Érdemes ezért a kert vagy a park kiemelt helyére telepítened, valamint balkonon tartva önmagam-ban is szépséget hozok balkonod terébe.

Betegségeim, kártevőim

Az előzőekben részletezett igényeim biztosítása esetén, normál díszkerti viszonyok között betegségek, kártevők nem támadnak.

Nem megfelelő körülmények között tartva megjelenhetnek rajtam kártevők és betegségek is:

Takácsatka (Tetranychus urticae)



Levelem fonákán szívogat. A károsított leveleim kezdetben az erek mentén, a szívogatás hatására sárgulnak, majd megbarnulnak, és idő-előtt lehullanak. Aztán a takácsatkára jellemző pókhálószerű szövedék lesz látható.

⇒Vegyszeres védekezés:

Az atkákat észlelve ajánlatos azonnal elkezdni védekezni, használható a Fulmite 200, a Sanmite 20 WP speciális atkaölő szerek valamelyike. Ezek hosszú hatástartamú (40-60 nap) atkaölő szerek, ezért jól időzítve lehet, hogy elég egy évben egyszer (április-május) elvégezni a permetezést.

	Szükség esetén a következő kezeléshez váltott szert használj!
Hortenzia lisztharmat (<i>Oidium hortensiae</i>)	Levelem színén a lisztharmatra nem jellemző, kör alakú, sárgás-fehér folt jelenik meg, amit csak hosszabb idő elteltével követ a levél fonákomon jelentkező, jellegzetes lisztharmat, amely esetenként az egész levélfelületemet is beboríthatja. Erős fertőzés esetén, már augusztusban elveszthetem lombozatomat. ⇒Védekezés Megjelenése kezdetén védekezhetsz a fertőzött levelek eltávolításával, elégetésével. ⇒Vegyszeres védekezés Erős fertőzés esetén, kéthetente lisztharmat elleni gombaölő szerrel szükséges permetezned, különösen ajánlott ez ott, ahol nagyobb állományomat tartasz fenn.
Fontos ősszel, és kora tavasszal lemosó-permetezésben részesítened, ehhez a Mészkénlé, a Nevikén és a Novenda lemosó-permetezőszerek valamelyike használható.	