

Igényeim:

Fény	Napfényen és félárnyékban is jól érzem jól magam.
Víz	Páraigényes, mezofita, az az közepes vízigényű fenyőféle vagyok. Idősebben a szárazságot jól viselem.
Hőmérséklet	Magyarország téli viszonyait kiválóan bírom.
Talaj	Talajra nem vagyok kényes, tápanyagigényem közepes. A pangó vizet nem viselem jól, ezért jó vízáteresztésű talajra ültess!
Egyéb	Egyike vagyok a legszebb elfekvő, kúszóborókáknak.

Felhasználásom:

Sziklakert	Sziklakerti környezetben felületek elfedésére használhatsz.
Balkon	Balkonok edényeiben, lecsüngő, szép hatású a látványom.
Talajtakaró	Díszkerti felületek hangulatos fedésére, ültetési sűrűségem: 1-2 db/m ²

Betegségeim, kártevőim:

Ellenálló vagyok a legtöbb kártevővel és betegséggel szemben, de figyelni kell a gyökérrothadásra, ha a talaj túl nedves!

Nedves, rossz vízelvezetésű talajon fordulhat elő - ilyen helyekre nem ajánlott ültetni!



⇒ **Gyökérrothadás (Verticillium spp.)**

Gombás betegség, mely a gyökerem károsítja, ezáltal a pusztulásomat okozhatja.

⇔ **Védekezés**

Ültetéskor helyem megfelelő megválasztása, a kielégítő körülményeim biztosításával, megfelelő talajviszonyok kiválasztásával, és a vízáradás helyes alkalmazásával elkerülhető a betegség. Amikor látszik, hogy hervadozom, csökkenteni kell a kijuttatott öntözővíz mennyiségét!



⇒ **Boróka rozsdá (Gymnosporangium spp.)**

Gombás betegség, melynek látható tünete a narancssárga kinövések, főként párás időben jelentkezhet.

⇔ **Védekezés**

Kielégítő körülményeim biztosítása. A megjelenő narancssárga, zselészerű képleteket (teliumokat) és az érintett ágakat szükséges visszavágni és megsemmisíteni!

⇒ Vegyszeres védekezés

A difenokonazol hatóanyagú készítmények (pl. **Score**, **Chorus**) hatékonyak lehetnek.



⇒ Boróka takácsatka (**Tetranychus urticae**)

Apró, pókszerű lények, levélkárosodást okoznak. Alattomos, szabad szemmel alig látható kártevő, amely a borókaféléken is megtelepedhet, különösen meleg, száraz időszakokban. Íme a legfontosabb tudnivalók: A leveleim fonákján apró, sárgás-fehéres pöttyök jelennek meg, amelyek klorofill-vesztésre utalnak. A leveleim bronzosodnak, sárgulnak, majd elszáradnak. Súlyos fertőzés esetén a leveleim között pókhálószerű szövedék jelenik meg. A fotoszintézis csökkenése miatt legyengülök, dekoratív értékem romlik.

⇒ Védekezés

Gyomirtás fontossága, ugyanis a takácsatkák sok gyomnövényen is megtelepednek, ahonnan átvándorolhatnak rám. Az ültetési helyem megfelelő megválasztása.

Kielégítő körülményeim biztosítása, és javasolt jó légjárású helyre ültetned.

⇒ Vegyszeres védekezés

A kártevőket észlelve azonnal speciális atkaölő szerek használata szükséges, mivel a takácsatkák nem rovarok, hanem pókszabásúak. Hatóanyagok, amelyek hatékonyak lehetnek: **Bifenazát**, **Fenpiroximát**, **Hexitiazox**, **Etoxazol**. Továbbá alkalmasak a **kéntartalmú szerek**, melyek lisztharmat ellen is hatékonyak, és atkagyérítő mellékhatással bírnak.

Permetezés technikája: Fontos a leveleim fonákjának alapos kezelése, mivel ott rejtőznek az atkák.

Általános védekezésképp, mondhatni megelőzésképp ajánlott ősszel, lombhullás után és kora tavasszal, lombfakadás előtt olajos lemosópermetezést alkalmaznod, az olaj elzárja a kórokozóktól a levegőt, miáltal így azok elpusztulnak, a **Mészkenlé**, **Nevikén** és **Vektafid** szerek ajánlottak. Fenyőféle örökzöld vagyok, ezért a keverék töménységére ügyelni kell, azaz kisebb töménységű keveréket javasolt készíteni!

