

Igényeim	
Fény	Leginkább a napos vagy a félárnyékos helyeket kedvelem.
Víz	Mezofita, azaz közepes vízigényű vagyok, a szárazságot nem jól viselem, öntözést pompás kinézettel hálálom meg.
Hőmérséklet	Teleket kiválóan viselem.
Talaj	Jó minőségű, tápanyagban gazdag, laza, jó vízellátottságú, enyhén savanyú kémhatású talajokat kedvelem igazán.
Egyéb	Lombom színe élénk aranyárga. Tavaszon a vesszőim végét az elvirágzott részekkel együtt, javasolt visszavágni, így több és szebb virágzást produkálok!

Felhasználásom	
Szoliter	Virágzásom egyedülállóan szép, valamint virágaim igen nagy méretűek, hosszan, május végétől július végéig virágzom, valamint virágaim illatosak.
Sövény	Alacsony, virágzó, jelzősövénynek kiválóan megfelelek.
Csoport	Virágzásom csoportosan is gyönyörű, valamint elvirágzásom után a lombom egész szezonban, lombhullásig díszít. Szép élénk aranysárga, ezért remek társításokra ad lehetőséget más dísznövények csoportjában.
Talajtakaró	Sűrűn takarom, virágzón a talajt. 60x40 centiméteres kötésbe ültess.

Betegségeim, kártevőim

Betegségekkel, kártevőkkel szemben közepesen ellenálló vagyok. Megfelelő kondícióban viszont ellenálló vagyok ezeknek.



Gyöngyvessző levéltetű (Aphis spiraeaphaga)

Nyár elején jelennek meg tömegesen, fiatal hajtásaimon. Fertőzésük látványos lehet. Nyár második felére a számukra kedvezőtlenre változó környezeti körülmények (magas hőmérséklet, száraz levegő) hatására állományuk jelentősen lecsökken.

⇔ Védekezés

Erős vízszugár.

⇔ Vegyszeres védekezés

Rovarölő szappan, piretroidok, javasolt szer a Mospilan 20 SP, a Karate 2,5 WG vagy a Vektafid rovarölő szerek valamelyike, levéltetű invázió esetén, azonnali permetezés ajánlott!



Takácsatka (*Tetranychus urticae*)

Főként száraz, forró időben támad! A leveleim fonákán szívogat. A károsított leveleim kezdetben az erek mentén, a szívogatás hatására sárgulnak, majd megbarnulnak, és idő-előtt lehullnak. Fonákjaikon a takácsatkára jellemző pókhálószerű szövedék látható.

⇔ Védekezés

Párásítás.

⇔ Vegyszeres védekezés

Az atkákat észlelve ajánlatos azonnal elkezdni védekezni, használható a **Fulmite 200**, a Sanmite 20 WP speciális atkaölő szerek valamelyike. Ezek hosszú hatástartamú (40-60 nap) atkaölő szerek, ezért jól időzítve lehet, hogy elég egy évben egyszer (április-május) elvégezni a permetezést. Szükség esetén a következő kezeléshez váltott szert használj!

Nem jelentős betegségek, de előfordulhat a lisztharmat (fehér bevonat a leveleken). Szellős ültetés, fertőzött részek eltávolítása, szükség esetén kén-tartalmú gombaölő szerek használata javasolt ellene. Továbbá még levélfoltosság jelenhet meg, ami ellen védekezhet réztartalmú szerekkel, lombhullás után tisztítás a lomb összesgyűjtésével és megsemmisítésével, mivel a levélfoltosság gombaképlete a lehullott leveleken telel át!

Általános tanács a betegségek és kártevők elkerülése érdekében a kondícióm biztosítása: Az ültetés helyének megfelelő kiválasztása, azaz napos, szellős hely, jó vízelvezetésű talaj. Fontos a rendszeres metszés és a szükséges tápanyag-utánpótlás biztosítása.

Megelőzőképp az áttelelő rovar- és gombaképletek gyérítése céljából, rügyfakadás előtt, korai lemosó-permetezésszükséges, ehhez a **Mészkenlé** és **Nevikén** szerek valamelyikének használata javasolt.